

## **Qutenza® 179 mg kutanes Pflaster**

**Wirkstoff:** Capsaicin.

**Zusammensetzung:** Jedes kutane Pflaster mit einer Fläche von 280 cm<sup>2</sup> enthält:

Wirkstoff: 179 mg Capsaicin entsprechend 640 Mikrogramm Capsaicin pro cm<sup>2</sup>

Pflaster. Sonstige Bestandteile - Pflaster: *Matrix:* Silikonklebstoffe,

Diethylenglycolmonoethylether (Ph.Eur.), Dimeticon 12500 cSt, Ethylcellulose N50 (E462); *Trägerschicht:* Polyester-Trägerfolie, Drucktinte mit Pigmentweiß 6;

*Abziehbare Schutzfolie:* Polyester-Schutzfolie; sonstiger Bestandteil mit bekannter

Wirkung - Reinigungsgel: Butylhydroxyanisol (Ph.Eur.) (E320) (0,2 mg/g) sonstige

Bestandteile - Reinigungsgel: Macrogol 300, Carbomer 1382, Gereinigtes Wasser, Natriumhydroxid (E524), Natriumedetat (Ph.Eur.).

**Anwendungsgebiete:** Behandlung von peripheren neuropathischen Schmerzen bei Erwachsenen entweder allein oder in Kombination mit anderen Arzneimitteln gegen Schmerzen.

**Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile.

**Nebenwirkungen:** Sehr häufig ( $\geq 1/10$ ): an der Stelle an der das Pflaster angewendet wird: Schmerzen, Rötung. Häufig ( $\geq 1/100$  bis  $< 1/10$ ): An der Stelle an

der das Pflaster angewendet wird: Juckreiz, Pusteln, Blasen, Schwellung,

Trockenheit, Brennendes Gefühl, erhöhter Blutdruck, Husten, Übelkeit, Juckreiz,

Gliederschmerzen, Muskelkrämpfe, Schwellung von Gliedmaßen. Gelegentlich ( $\geq$

$1/1.000$  bis  $< 1/100$ ): Gürtelrose (Herpes zoster); vermindertes

Geschmacksempfinden; verringertes Gefühl in Gliedmaßen; Augenreizung; zu

schneller, zu langsamer oder ungewöhnlicher Herzschlag (Atrioventrikulärer Block

(AV-Block) ersten Grades, Tachykardie, Palpitationen); Rachenreizung; an der Stelle

an der das Pflaster angewendet wird: Quaddeln, Kribbelgefühl, Entzündung,

erhöhtes oder vermindertes Gefühl in der Haut, Hautreaktion, Reizung,

Hautblutungen. Nicht bekannt (*Häufigkeit kann anhand der vorliegenden Daten nicht*

*bestimmt werden*): Hautverbrennungen zweiten Grades; versehentliche Exposition

(einschließlich Augenschmerzen, Augen- und Rachenreizung und Husten); tiefe

Rötung an der Stelle an der das Pflaster angewendet wird; Blasenbildung/Nässen

der Haut; sehr berührungsempfindliche, geschwollene, feuchte oder glänzende Haut.

In klinischen Studien an gesunden Probanden wurden vorübergehende leichte

Veränderungen der Wärmewahrnehmung (1°C bis 2°C) und stechende

Empfindungen festgestellt. **Warnhinweise:** Reinigungsgel enthält Butylhydroxyanisol.

Vor Anwendung Packungsbeilage beachten. Arzneimittel für Kinder unzugänglich

aufbewahren. **Lagerhinweis:** Flach liegend im Originalbeutel und Umkarton

aufbewahren. Nicht über 25°C lagern. Nach dem Öffnen des Beutels innerhalb von 2

Stunden anwenden. **Verschreibungspflichtig.** Weitere Einzelheiten enthalten die

Fach- und Gebrauchsinformation.

**Stand der Information:** 01/2021

Grünenthal GmbH • 52099 Aachen • Deutschland