

**Tapentadol Libra-Pharm® retard 25mg/50 mg/100 mg/150 mg/200 mg/250 mg  
Retardtabletten  
Tapentadol Libra-Pharm® 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen  
Tapentadol Libra-Pharm® Akutschmerz 50 mg Filmtabletten**

**Verschreibungspflichtig/Betäubungsmittel**

**Wirkstoff:** Tapentadol (als Hydrochlorid).

**Zusammensetzung:** *Arzneilich wirksamer Bestandteil:* Tapentadol (als Hydrochlorid). *Sonstige Bestandteile:* Tapentadol Libra-Pharm retard 25 mg-250 mg Retardtabletten (als 29,12 mg -291,20 mg Tapentadolhydrochlorid): *Tablettenkern:* Hypromellose, Mikrokristalline Cellulose, Hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat (Ph.Eur.). *Tablettenüberzug:* Hypromellose, Lactose-Monohydrat, Talkum, Macrogol 6000, Polypropylenglycol, Titandioxid (E 171). *Zusätzlich in Tapentadol Libra-Pharm retard 100 mg Retardtabletten:* Eisen(III)-hydroxid-oxid x H<sub>2</sub>O (E 172). *Zusätzlich in Tapentadol Libra-Pharm retard 150 mg Retardtabletten:* Eisen(III)-hydroxid-oxid x H<sub>2</sub>O (E 172), Eisen(III)-oxid (E 172). *Zusätzlich in Tapentadol Libra-Pharm retard 200 mg Retardtabletten:* Eisen(III)-hydroxid-oxid x H<sub>2</sub>O (E 172), Eisen(III)-oxid (E 172). *Zusätzlich in Tapentadol Libra-Pharm retard 250 mg Retardtabletten:* Eisen(III)-hydroxid-oxid x H<sub>2</sub>O (E 172), Eisen(III)-oxid (E 172), Eisen(II,III)-oxid (E 172). *Sonstige Bestandteile:* Tapentadol Libra-Pharm 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen: Natriumbenzoat (E211), Natriumhydroxid, Citronensäure-Monohydrat, Sucralose, Himbeer-Aroma (enthält Propylenglycol), gereinigtes Wasser.

*Sonstige Bestandteile:* Tapentadol Libra-Pharm Akutschmerz 50 mg Filmtabletten (als 58,24 mg Tapentadolhydrochlorid): *Tablettenkern:* Mikrokristalline Cellulose, Lactose-Monohydrat, Croscarmellose-Natrium, Povidon K30, Magnesiumstearat (Ph. Eur.). *Tablettenüberzug:* Poly(vinylalkohol), Titandioxid (E 171), Macrogol 3350, Talkum.

**Anwendungsgebiete:** Tapentadol Libra-Pharm retard 25 mg-250 mg Retardtabletten: Behandlung von starken, chronischen Schmerzen bei Erwachsenen, die nur mit Opioid-Schmerzmitteln ausreichend behandelt werden können.

Tapentadol Libra-Pharm 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen: Behandlung von mäßig starken bis starken, akuten Schmerzen bei Kindern ab 2 Jahren und bei Erwachsenen, die nur mit Opioid-Schmerzmitteln ausreichend behandelt werden können. Nicht für Kinder mit einem Körpergewicht von 16 kg oder weniger, Tapentadol Libra-Pharm Akutschmerz 50 mg Filmtabletten: Behandlung von mäßig starken bis starken, akuten Schmerzen bei Erwachsenen, die nur mit Opioid-Schmerzmitteln ausreichend behandelt werden können.

**Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen Tapentadol oder einen der sonstigen Bestandteile von Tapentadol Libra-Pharm retard 25-250 mg Retardtabletten bzw. Tapentadol Libra-Pharm 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen bzw. Tapentadol Libra-Pharm Akutschmerz 50 mg Filmtabletten; Asthma oder eine bedrohlich langsame oder flache Atmung (Atemdepression, Hyperkapnie); Darmlähmung; akute Vergiftung durch Alkohol, Schlafmittel, zentral wirksame Schmerzmittel oder psychotrope Substanzen (Arzneimittel mit Wirkung auf Stimmungslage und Gefühlsleben).

**Nebenwirkungen:** Tapentadol Libra-Pharm retard 25 mg-250 mg Retardtabletten: Sehr häufig: Schwindel, Somnolenz, Kopfschmerz, Übelkeit, Verstopfung. Häufig: verminderter Appetit, Angst, depressive Verstimmung, Schlafstörungen, Nervosität, Ruhelosigkeit, Aufmerksamkeitsstörung, Tremor, unwillkürliche Muskelkontraktionen, Erröten, Kurzatmigkeit, Erbrechen, Durchfall, Verdauungsstörungen, Juckreiz, verstärktes Schwitzen, Hautausschlag, Asthenie, Müdigkeit, Gefühl der Körpertemperaturveränderung, trockene Schleimhäute, Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe (Ödeme). Gelegentlich: Überempfindlichkeit gegenüber dem Arzneimittel (einschließlich Angioödem und in schweren Fällen Atembeschwerden, Abfall des Blutdrucks, Kollaps oder Schock), Gewichtsverlust, Desorientiertheit, Verwirrheitszustand, Erregbarkeit (Agitiertheit), Wahrnehmungsstörungen, ungewöhnliche Träume, euphorische Stimmung, Bewusstseinsstörungen, Beeinträchtigung des Erinnerungsvermögens, mentale Beeinträchtigung, sich einer Ohnmacht nahe fühlen (Synkope), Sedierung, Gleichgewichtsstörungen, Sprachstörungen, Taubheitsgefühl (Hypästhesie), abnorme Hautempfindungen (z. B. Kribbeln, Prickeln) (Parästhesie), Sehstörungen, beschleunigter Herzschlag, verlangsamter Herzschlag, Herzklopfen, erniedrigter Blutdruck, Bauchbeschwerden, Nesselsucht, Harnverhalt, Pollakisurie, sexuelle Dysfunktion, Arzneimittelentzugssyndrom, Störungen des Allgemeinbefindens, Reizbarkeit. Selten: Arzneimittelabhängigkeit, abnormes Denken, epileptischer Anfall, Präsynkope, Koordinationsstörungen, bedrohlich langsame oder flache Atmung (Atemdepression), gestörte Magenentleerung, Trunkenheitsgefühl, Gefühl der Entspannung. Nicht bekannt: Delirium.

*Tapentadol Libra-Pharm 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen und Tapentadol Libra-Pharm Akutschmerz 50 mg Filmtabletten:* Sehr häufig: Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Schläfrigkeit, Kopfschmerz. Häufig: verminderter Appetit, Ängstlichkeit, Verwirrtheit, Halluzinationen, Schlafstörungen, ungewöhnliche Träume, Zittern, Erröten, Verstopfung, Durchfall, Verdauungsstörungen, Mundtrockenheit, Juckreiz, verstärktes Schwitzen, Hautausschlag, Muskelkrämpfe, Schwächegefühl, Müdigkeit, Empfinden von Schwankungen der Körpertemperatur. Gelegentlich: depressive Verstimmung, Desorientiertheit, Erregbarkeit (Agitiertheit), Nervosität, Ruhelosigkeit, euphorische Stimmung, Aufmerksamkeitsstörung, Beeinträchtigung des Erinnerungsvermögens, sich einer Ohnmacht nahe fühlen (Synkope), Sedierung, Schwierigkeiten bei der Kontrolle der Bewegungsabläufe, Sprachstörungen, Taubheitsgefühl (Hypästhesie), abnorme Hautempfindungen (z. B. Kribbeln, Prickeln) (Parästhesie), Muskelzucken, Sehstörungen, beschleunigter Herzschlag, Herzklopfen, erniedrigter Blutdruck, bedrohlich langsame oder flache Atmung (Atemdepression), weniger Sauerstoff im Blut, Kurzatmigkeit, Bauchbeschwerden, Nesselsucht, Schweregefühl, verzögertes Wasserlassen, häufiges Wasserlassen, Arzneimittelentzugssyndrom, Flüssigkeitsansammlung im Gewebe (Ödem), Störungen des Allgemeinbefindens, Trunkenheitsgefühl, Reizbarkeit, Gefühl der Entspannung. Selten: Arzneimittelallergie (einschließlich Schwellung des Gesichts und der Schleimhäute im Mund und Rachenraum (Angioödem) und in schweren Fällen Atembeschwerden, Abfall des Blutdrucks, Kollaps oder Schock), abnormes Denken, epileptischer Anfall, Bewusstseinsstörungen, abnorme Koordination, verlangsamter Herzschlag, gestörte Magenentleerung. Nicht bekannt: Delirium.

*Tapentadol Libra-Pharm retard 25 mg-250 mg Retardtabletten, Tapentadol Libra-Pharm 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen und Tapentadol Libra-Pharm Akutschmerz 50 mg Filmtabletten:* Allgemein ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Selbstmordgedanken und entsprechendem Verhalten bei Patienten erhöht, die unter chronischen Schmerzen leiden. Zusätzlich können Arzneimittel zur Behandlung von Depressionen (die eine Wirkung auf die Botenstoffe im Gehirn haben) dieses Risiko besonders zu Beginn einer Behandlung erhöhen. Obwohl Tapentadol auch Botenstoffe im Gehirn beeinflusst, geben die Daten zur Anwendung von Tapentadol beim Menschen keinen Anhalt für das Vorliegen eines solchen erhöhten Risikos.

*Tapentadol Libra-Pharm 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen:*

Bei Kindern und Jugendlichen wurden keine zusätzlichen Nebenwirkungen beobachtet.

**Weitere Angaben zur Verwendung bei Kindern und Jugendlichen:** Nur im Krankenhaus verabreichen, wobei die Anwendung nicht länger als 3 Tage erfolgen darf. Empfohlene Einzeldosis 1,25 mg pro kg Körpergewicht alle 4 Stunden. Maximale Dosis pro Tag: 7,5 mg pro kg Körpergewicht ( $\approx 6 \times$  Einzeldosis).

*Tapentadol Libra-Pharm 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen* ist zur Verwendung bei Kindern und Jugendlichen mit einem Körpergewicht von mehr als 16 kg bestimmt.

**Warnhinweis:** *Tapentadol Libra-Pharm retard 25 mg-250 mg Retardtabletten und Tapentadol Libra-Pharm Akutschmerz 50 mg Filmtabletten* enthalten Lactose. Packungsbeilage beachten.

**Lagerhinweis:** *Tapentadol Libra-Pharm 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen:* Die Lösung darf nach Anbruch nicht länger als 6 Wochen verwendet werden. Die Flasche in aufrechter Position stehend lagern.

**Stand der Information: 10/2022**

Libra-Pharm GmbH • 52099 Aachen • Deutschland

Oben beschriebener Pflichttext bezieht sich auf die folgenden Gebrauchsinformationen:

<u>Produkt</u>	<u>Stand</u>
<i>Tapentadol Libra-Pharm</i> ® retard 25/50/100/150/200/250 mg	10/2022
<i>Tapentadol Libra-Pharm</i> ® 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen	10/2022
<i>Tapentadol Libra-Pharm</i> ® Akutschmerz 50 mg Filmtabletten	10/2022